

## A V E R T I S S E M E N T

## MONILIA de l'ABRICOTIER

Zones I et II

Les attaques de cette maladie pourront se produire dès que les bourgeons auront dépassé le stade B, du tableau publié en annexe.

Effectuer un traitement soigné avec :

- Bouillie bordelaise à 2 % légèrement alcaline
- Bouillie à l'oxychlorure de cuivre ( aux doses prescrites
- Bouillie à l'oxyde cuivreux ( par les
- Bouillie au sulfate basique de cuivre ( fabricants

Répéter ce traitement lorsque les premières fleurs s'ouvriront (stade F)

## I N F O R M A T I O N

## CLOQUE - CORYNEUM

Zones I - II et III

Réaliser un traitement soigné avant le départ de la végétation avec l'un des produits préconisés contre le Monilia.

Suivre minutieusement les rameaux.

J.H. Hale, Elberta, Ch. Ingouf, Alexander, Dr Aribaud sont parmi les variétés les plus sensibles.

## DESHERBAGE DES CEREALES

Toutes régions

En raison de l'automne et de l'hiver très humides, il paraît opportun de réaliser un traitement chimique sélectif.

Utiliser un produit à base d'hormones de synthèse, par exemple celles dérivées du 2-4-D (acide 2-4 dichlorophenoxyacétique) et du M.C.P.A. (acide 2 méthyl. 4 chloro-phenoxyacétique) ou bien une spécialité commerciale à base de colorants nitrés.

Employer les hormones avec précautions pour éviter les accidents végétatifs. Respecter scrupuleusement les recommandations des fabricants.

L'Inspecteur de la  
Protection des Végétaux,


P. BERVILLE

Le Contrôleur chargé  
des Avertissements Agricoles,

L.L. TROUILLON

---

Reproduction ou adaptation réservées. - Autorisation du 23 Janvier 1953  
Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles du Languedoc Roussillon 16 rue de la République - Montpellier - Le Gérant : R. BERTRAND.



Stades végétatifs de l'ABRICOTIER